


まつ毛貧毛症治療薬 (FDA承認) Latisse™ (ラティース™)のご案内

当クリニックでは、まつ毛貧毛症治療薬として、FDA(米国医薬品局)が世界で初めて承認した、Latisse™ (ラティース™)の取り扱いを開始いたしました。

まつ毛貧毛症とは、まつ毛が貧弱で不十分なことをいい、ラティース™はまつ毛貧毛症用の治療薬でまつ毛を長く、太く、濃い色にします。

ラティース™ (米国 Allergan社製)



主要有効成分:

ビマトプロスト(Prostaglandin F2 誘導体)3mg/mL(0.03%)

包装

- ・3mL入り点眼容器
- ・滅菌済み単回使用アプリケーター60本入り

ビマトプロストの効能について

- ・毛周期における成長期の延長 まつ毛の長さの伸長
- ・休眠状態にある毛包の刺激 まつ毛の厚みや太さの増加
- ・メラニン合成の活性化 まつ毛の色素沈着
暗色に作用します。

副作用について

- ・眼障害: 結膜充血、眼そう痒症、眼刺激、
眼乾燥、眼瞼の紅斑、眼瞼乳頭症
 - ・皮膚及び皮下組織障害: 皮膚色素過剰
- 禁忌**
- ・ビマトプロストまたは本剤に含まれる他の成分に過敏な患者様

ラティース™のご使用方法

上まぶたのまつ毛のつけ根に毎晩1回塗布してください。(目や下まぶたには使用しないでください。)



1. メイクを落とし、洗顔後に塗布します。
 2. 片眼ごとに滅菌済みアプリケーターを使って、アプリケーターのブラシ部分にラティース™を1滴滴下して使用します。
 3. アプリケーターで上眼瞼辺縁部のまつ毛基部に塗布してください。
 4. 塗布後、塗布部分以外の余分な薬剤を拭き取ってください。
 5. 感染症等を防ぐため一本のアプリケーターで両眼に使用しないでください。
- *コンタクトレンズは外してから塗布すること。再度コンタクトレンズを装着する場合は15分間経過してからにすること。

塗布期間:

- ・効果ははっきり見えるまで少なくとも2ヶ月間塗布を続けることを推奨します。
- ・効果を持続させるには、継続して使う必要があります。
- ・使用を中止すると、数週間から数カ月かけて、まつげの平時的な毛周期に伴ない、徐々に元のまつげに戻っていきます。

Latisse™の効能・効果について

総合的まつ毛評価尺度でベースラインから1グレード以上の上昇を示した被験者数 (%)
(有効性の主要評価項目 第16週)

週	Latisse™ N=137 N (%)	溶媒 N=141 N (%)
1	7 (5%)	3 (2%)
4	20 (15%)	11 (8%)
8	69 (50%)	21 (15%)
12	95 (69%)	28 (20%)
16	107 (78%)	26 (18%)
20	103 (79%)	27 (21%)

第16週時点の有効性評価項目 (ベースラインからの平均変化)	Latisse™	溶媒
まつ毛の成長(長さ) (mm; 増大率%)	N=137 1.4; 25%	N=141 0.1; 2%
まつ毛の太さや厚み (mm ² ; 増大率%)	N=136 0.7; 106%	N=140 0.1; 12%
まつ毛の色の濃さ (明暗度*; 色の濃さの増大率%)	N=135 -20.2; -18%	N=138 -3.6; -3%

* マイナスの数値はまつ毛の色が濃くなっていることを示す。

** 臨床試験に含まれたアジア人で

グレード評価が1度以上上昇した率13/18(72.2%)

臨床試験では、第16週の時点で78%の人に
全3測定項目(長さ、太さ、色の濃さ)で有意な増大が認められています

Latisse™症例のご紹介



第16週—最大効果：
まつ毛が25%長く、
106%太く、18%濃い色になる

第8週：ほとんどの人に
目に見える効果あり

第4週：
目に見える効果が
出はじめる人あり

第1週：日課に慣れる

効果には個人差があります。

くわしくは、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。